


ETOFUM - FL ERBICIDA SELETTIVO PER LA COLTURA DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA MECCANISMO D'AZIONE: INIBITORE DELLA SINTESI LIPIDICA - CODICE HRAC: N	
Composizione 100 grammi di prodotto contengono: Etofumesate puro: g 44.4 (500 g/L) Coformulanti q.b. a g 100	ATTENZIONE 
INDICAZIONI DI PERICOLO H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.	
CONSIGLI DI PRUDENZA P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.	
Titolare dell'autorizzazione: UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, The Netherlands Tel. +31 (0) 850712300 Distribuito da: UPL Italia S.r.l. - Via Terni 275, Località San Carlo, 47522 Cesena (FC) Tel. 0547 661523; SCAM S.p.A. - Strada Bellaria 164, 41126 Modena Tel. (+39) 059 586511 Stabilimenti di produzione: UPL Europe Ltd. Sandbach, Cheshire, CW113QQ Gran Bretagna; CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda); Arysta Lifescience Ougrée Production SPRL – Ougrée (Belgio) Stabilimento di rietchettatura: ARCO Logistica S.r.l. – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara Registrazione del Ministero della Salute N° 8874 del 10.06.1996	
Contenuto netto: 0.5-1-2-3-5-10-20 L	Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 20 metri da corpi idrici superficiali per gli usi pre-emergenza (barbabietola a semina primaverile e autunnale) e post-emergenza (barbabietola a semina autunnale).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: ETOFUM-FL è un diserbante selettivo che viene impiegato per il diserbo della barbabietola da zucchero a semina primaverile e autunnale. Il prodotto agisce per assorbimento radicale e fogliare sulle infestanti quando sono in fase di germinazione o allo stadio giovanile.

Si consiglia di impiegare il prodotto in miscela con altri erbicidi ad azione complementare quali ad esempio formulati a base di metamitron, lenacil, fenmedifam, ecc...

ETOFUM-FL è efficace contro le seguenti principali infestanti: *Avena* spp. (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Mordigallina), *Apera spica-venti* (Capellini dei campi), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Setaria viridis* (Falso panico), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Grespino comune), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta), *Spergula arvensis* (Renaiola comune), *Stellaria media* (Centocchio).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Barbabietola a semina primaverile

- Pre-semina o pre-emergenza: litri 2 per ettaro in combinazione con formulati a base di Lenacil, Metamitron o altro erbicida complementare, in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione. Nel trattamento di pre emergenza intervenire subito dopo la semina e prima dell'emergenza delle infestanti.
- Post-emergenza: litri 1-1,2/ha in combinazione con formulati a base di Fenmedifam od altro erbicida complementare, in 300 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.

Barbabietola a semina autunnale

- Pre-semina o pre-emergenza: litri 2/ha in combinazione con formulati a base di Lenacil o altro erbicida complementare, in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione.
- Post-emergenza: litri 1.2-1.5/ha con 5-6 litri di Fenmedifam o altro erbicida complementare, in 300 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.

Non superare la dose massima di 1 kg/ha di etofumesate ogni 3 anni sullo stesso appezzamento di terreno.

Avvertenza: nei trattamenti di pre-semina e pre-emergenza il prodotto non si deve impiegare su terreni sabbiosi e con alto contenuto di sostanza organica (più del 5%). Dopo il trattamento di pre-emergenza, il terreno deve essere sufficientemente umido; in caso contrario effettuare un intervento irriguo. Nel caso si dovesse effettuare una risemina di altra coltura, realizzare prima un'aratura profonda.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con i più comuni agrofarmaci registrati per l'uso su barbabietola da zucchero. In caso di dubbio effettuare un saggio preliminare.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e bestiame.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

GESTIONE DELLE RESISTENZE: quando erbicidi con la stessa modalità d'azione sono utilizzati più volte per diversi anni nello stesso appezzamento, può aver luogo la selezione di biotipi resistenti. Questi possono propagarsi e diventare dominanti. Un'infestante è considerata resistente a un erbicida se sopravvive ad un trattamento correttamente eseguito alla dose raccomandata. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, alternare o miscelare ETOFUM-FL con prodotti aventi una differente modalità d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche alternative di controllo delle infestanti (es. la rotazione colturale, gli interventi meccanici e la falsa semina).

Uso consentito solo fino allo stadio di sviluppo BBCH 18

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso – Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente